

İLAC KULLANIM BİLGİSİ KILAVUZU

Derleyenler

Ecz. İsmail Üstel
Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık İşletmeciliği Doçenti

Ecz. M. Fethi Şahin
Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Kimya Doktoru

Kaynaklar

- 1) «Cautionary and Advisory Labels for Dispensed Medicines : Revised Guide», The Pharmaceutical Journal, 234, 365-372, March 23, 1985.
- 2) Smith, D.L., Medication Guide for Patient Counseling, Lea and Febiger, Philadelphia, Pennsylvania, A.B.D., 1977.
- 3) USP DI, Vol. I. Drug Information for the Health Care Provider, United States Pharmacopeial Convention, Inc., Rockville, Maryland, A.B.D., 1982.
- 4) Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 28. edition, The Pharmaceutical Press, London, İngiltere, 1982.

İlaç Kullanım Bilgisi Kılavuzu

Kod Açıklamaları

- | Kod | Açıklama |
|-----|---|
| 1) | Tok karnına (yemek arasında ya da yemekten sonra) alınız. |
| 2) | Aç karnına (yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra) alınız. |
| 3) | Yemekten yarım saat önce alınız. |
| 4) | Bol sıvı ile alınız. |
| 5) | Uygunuzun getirebilir, bu durumda araç ve tehlikeli makine kullanmayınız. |
| 6) | Alkollü içki içmeyiniz. |
| 7) | Başdönmesi ve sersemlik yapabilir, bu durumda araç ve tehlikeli makine kullanmayınız, merdiven inip çıkarken dikkatli olunuz ve yataktan aniden kalkmayınız. |
| 8) | Ağız kuruluğu yapabilir, bu durumda ekşi şekerlemeler ve ciklet çiğnemek yardımcı olabilir. |
| 9) | Güneşte kalmayınız ve bronzlaşmak amacıyla ultraviyole lamba kullanmayınız. |
| 10) | İdrarı/gaitayı renge boyayabilir, bu durum ilacı kesmenizi gerektirmez. |
| 11) | Potasyum bakımından zengin yiyecekler yeyiniz: portakal, greyfurt, domates, karpuz, muz, hurma. |
| 12) | Eski peynir, bakla, çukulata, salamura balık, tavuk ciğeri, fermente olmuş besinleri yemekten ve şarap, kahve, kafeinli içecekleri içmekten kaçınınız. |
| 13) | Salisilat içeren ilaçlar (örneğin, aspirin) kullanmayınız. |
| 14) | Süt ve sütlü yiyecekler yemeyiniz. Demir preparatlarını, demir içeren vitamin preparatlarını ve belirli antasitleri bu ilaçtan ancak 3 saat önce ya da 2 saat sonra kullanınız. |

- 15) Demir preparatlarını, demir içeren vitamin preparatlarını ve belirli antasitleri bu ilaçtan ancak 3 saat önce ya da 2 saat sonra kullanınız.
- 16) Bu ilacı kullandığınızı belirten bir kart taşımanız doğru olacaktır.
- 17) Görüş keskinliğinizi azaltarak bulanık görmeye neden olabilir, bu durumda araç ve tehlikeli makine kullanmayınız.
- 18) Şeker hastaları düzenli olarak idrarda şeker kontrolü yapmalı ve herhangi bir anormallik gördüklerinde hekime başvurmalıdır.

Allopurinol	1.4	Benzotropin	4.5,6,7,8,17
Aloksipirin	1	Betahistin	1
Alprazolam	5.6.7	Betametazon	1.18
Alseroksilon	1.5,7	Betanekol	2
Alverin	5.7	Betanidin	1
Amantadin	5.6,7,8,17	Bezafibrat	1
Ambenonyum	7	Biperiden	1,5,7,8,17
Ametopterin	1.5,6,9,17	Bromazepam	5.6,7
Aminofilin	1	Bromdifenhidramin	1,5,6,7,8
Amitriptilin	5,6,7,8,17	Bromfeniramin	1,5,6,7,8
Ampisilin	2	Bromokriptin	1
Anileridin	6.7	Buklizin	1,3,5,6,7,8
Anisindion	6.10 (idrar : turuncu), 13.16	Butobarbital	5.6
Anizotropin	3,7,8,17	Butriptilin	5,6
Asenokumarol	6.13,16	Çinko sülfat	1
Asetazolamid	5,6	Dantrolen	5,6,9
Asetilsalisilik asit	1	Dantron	10 (idrar : pembe veya turuncu)
Asetoheksamit	6,9	Deksametazon	1.18
Atropin	3,7,8,17	Dekstrometorfan	5,6
Azapropazon	9	Dekstropropoksifen	5,6
Baklofen	5,6	Dekstrotiroksin	17
Befenyum	2	Demeklosiklin	2,9,14
Benaptrizin	7,8,17	Demir preparatları	1,10 (gaita : siyah)
Bendrofluazid	1,11	Deserpidin	1,5
Benzperidol	5,6	Desipramin	5,6,8,9
Benztiyazid	1,11		

Diazepam 5,6,7
 Dienestrol 1,18
 Dietilstilbestrol 1,18
 Difenadion 6,10 (idrar: turuncu),
 13,16
 Difenhidramin 1,5,6,7,8
 Difenidol 3,5,6,7,8,17
 Dihidrokodein 1,5,6
 Dikloksasilin 2
 Dikumarol 6,13,16
 Dimenhidrinat 1,5,6,7,8
 Dimetisteron 1,18
 Dipiridamol 3,7
 Disiklomin 5,7,8,17
 Disopramit 6,7
 Disülfiram 5,6
 Doksepin 5,6,8
 Doksisiklin 9,15
 Dotiyepin 5,6
 Droperidol 5,6
 Efedrin 1
 Eritritil tetranitrat 6,7,16
 Eritromisin 1
 Estramustin 1
 Etakrinik asit 1,11
 Etambutol 1,17
 Etil biskumasetat 6,13,16
 Etilestrenol 1,18
 Etinamat 5,6
 Etinil estradiol 1,18
 Etisteron 1,18
 Etiyonamit 1
 Etklorvinol 1,5,6,17
 Etopropazin 5,7,8,17
 Etosüksimit 5,6,7,16
 Etotoin 1,5,7,16
 Fenasemid 1,16
 Fenazopiridin 1,10 (idrar: kırmızı
 turuncu)
 Fenelzin 5,6,7,8,12,17
 Fenformin 1,6
 Fenilbutazon 1,17
 Fenindamin 1,5,6,7,8
 Fenindion 6,10 (idrar: turuncu),
 13,16
 Fenitoin 1,4,5,6,7,16,17
 Fenmetrazin 7
 Fenobarbital 5,6
 Fenoltalein 10 (idrar: pembe -
 mor)
 Fenoprofen 1,5,7
 Fenprokumon 6,13,16
 Fensüksimit 5,7,16
 Floksimesteron 1,18
 Florourasil 1
 Fludrokortizon 1,18

Flufenamik asit 1
Flufenazin 5,6,7,8
Flukloksasilin 2
Flunitrazepam 5,6,7
Flurazepam 5,6,7
Furazolidon 6,10 (idrar : kahverengi), 12
Furosemid 1,11
Gliburid 1,6,9,13
Glikopirolat 5,8,17
Glutamik asit 1
Glutetimit 5,6,7
Griseofulvin 1,8
Guanetidin 1,6,8,17
Haloperidol 5,6,7,8
Hidralazin 6,7
Hidroflumetiyazid 1,11
Hidroklorotiyazid 1,11
Hidrokokodon 5,6
Hidrokortizon 1,18
Hidroksiklorokin 1,17
Hidroksizin 5,6,8
Hidromorfon 5,6
İbuprofen 1,7,17
İmipramin 5,6,8,9,17
İndometasin 1,5,7
İnsülin 16

İproniazid 5,6,7,8,12,17
İtramin 7
İzoamil nitrit 6
İzokarboksazid 5,6,7,8,12,17
İzoksuprin 7
İzoniazid 1,6,8
İzopropamit 4,8,17
İzoproterenol 7
İzosorbit dinitrat 6,7,16
Karbamazepin 1,5,6,8,9,16
Karbenoksolon 1
Karbinoksamin 1,5,6,7,8
Karizoprodol 5,6,7
Kaskara 10 (İdrar: sarı - kahverengi veya kırmızı)
Kemotripsin 3
Ketazolam 5,6
Ketokonazol 1
Ketoprofen 1
Ketotifen 1,5,6
Kinakrin 10 (idrar : koyu sarı)
Kinalbarbital 5,6
Kinetazon 1,11
Klidinyum 7,8,17
Klindamisin 4
Klobazam 5,6,7
Klofazimin 1,10 (idrar : kırmızı -

ANKARA ECZACI ODASI
TEB

kahverengi)	Kortizon 1,18
Klofibrat 1,7	Ko-trimoksazol 4,9
Kloksasilin 2	Kriptenamin 2,7,17
Klomipramin 5,6,7,8,9	Labetalol 1
Klonazepam 5,6,16	Levodopa 1,5,7,8,10 (idrar: kırmızı)
Klonidin 5,6,8	Linkomisin 2
Kloral hidrat 4,5,6	Lityum karbonat 1,4,5,8,17
Klorambusil 2	Lofepamin 5,6
Kloramfenikol 2	Loksapin 5,6
Klorazepat 5,6,7,8	Loprazolam 5,6
Klordiazepoksit 5,6,7	Lorazepam 5,6,7
Klorfeniramin 1,5,6,7,8	Lormetazepam 5,6,7
Klorfenoksamin 1,5,7,8,17	Mebanazin 5,6,7,8,12,17
Klormetiyazol 5,6	Medazepam 5,6,7
Klormezanon 5,6,7,8	Medroksiprojesteron 1,18
Klorokin 1,10 (idrar: sarı kah- verengi veya kahverengi), 17	Mefenamik asit 1
Klorotiyazid 1,11	Mefenesin 1,5,6
Klorotrianisen 1,18	Mefenitoin 5,7,16
Klorpromazin 5,6,7,8,9	Mekamilamin 1,6,7,8
Klorpropamit 1,6	Meklizin 1,5,6,7,8
Klorprotiksen 5,6,7,8,9	Mepenzolat 1,4,5,7,8,17
Klorsiklizin 1,5,6,7,8	Meperidin 5,6,7,8
Klortetrasiklin 2,9,14	Mepiramin 1,5,6,7,8
Klorzoksazon 5,6	Meproamat 1,5,6,7
Kodein 5,6	Metadon 5,6
Kolestiramin 1	Metaksalon 5,6,7,8
	Metalenestril 1,18

Metandriol 1.18	Minosiklin 9,15
Metandrostenolon 1.18	Molindon 5,6,8
Metantelin 4,5,7,8,17	Nafsilin 2
Metdilazin 1,5,6,7,8	Nalidiksik asit 1,5,7,9,17
Metenamin 4	Naprosken 7
Metformin 1.6	Natamisin 1
Metiksen 5,6,7,8,17	Nialamit 5,6,7,8,12,17
Metildopa 1,5,6,7,8	Nifedipin 1
Metilfenidat 7,8	Niklosamid 4
Metilprednizolon 1.18	Nikotinic asit 1
Metiltestosteron 1.18	Nimorazol 1.6
Metiprilon 5,6,7	Nitrazepam 5,6,7
Metiserjid 1,5,6,7	Nitrofurantoin 1.10 (idirar : kahverengi)
Metokarbamol 1,5,6,7	Nitroglicerin 6,16
Metoklopramit 3,5,6,7,12	Noretandrolon 1,18
Metoksalen 1	Noretindron 1.18
Metoksifenamin 5,6	Nortriptilin 5,6,8,17
Metolazon 5,6,7,8	Noskapin 5
Metoserpidin 1,5,6,7	Oksasilin 2
Metotreksat 6,9	Oksazepam 5,6,7
Metotrimeprazin 5,6,7,8,9	Oksifenbutazon 1,17
Metronidazol 1,6,8,10 (idirar : koyu renk)	Oksifensiklimin 3,7,8,17
Metskopolamin 3,5,7,8,17	Oksikodon 1,5,6,7
Metsüksimit 5,7,16	Oksimorfon 5,6,7
Mezoridazin 5,6,7,8	Oksitetrasiklin 2,9,14
Mikonazol 1	Oksolinik asit 5,7,17

Okspentifilin 1	Pizotifen 1.5.6,7,8
Okstrifilin 1	Politiyazid 1,11
Orfenadrin 4,5,6,7,8,17	Potasyum preparatları 1
Pankreatin 1	Prazepam 5,6,7
Pankrelipaz 3	Prednizolon 1,18
Papaverin 1	Prednizon 1,18
para - Aminosalisilik asit 1	Primidon 5,6,7,16
Paraldehit 5,6	Probenesid 1,4,13
Parametadion 5,16,17	Probukol 1
Parasetamol 1	Proguanil 1
Parjilin 5,6,7,8,12,17	Prokarbazin 5,6,8,12,17
Pemolin 5,7	Proklorperazin 5,6,7,8,9
Penisilamin 2,4,15	Promazin 5,6,7,8,9
Pentaeritritol tetranitrat 2,6,7,16	Prometazin 1,5,6,7,8,9
Pentazosin 1,5,6,7,17	Propantelin 1,4,5,6,7,8,17
Pentobarbital 5,6	Propiltiyourasil 5
Pentolinyum 7,17	Propoksifen 5,6,7
Perfenazin 5,6,7,8,9	Propranolol 5,7,8
Perisiyazin 5,6	Prosiklidin 1,7,8,17
Pimozid 5,6,7,8	Protriptilin 5,6,7,8,9,17
Pipenzolat 7,8,17	Reserpin 1,5,6,7
Piperasetazin 5,6,7,8,9	Resinamin 1,5,7
Piperidolat 7,8,17	Rifampin 2,5,7,10 (idrar ve gaita : kırmızı - turuncu)
Piretanid 1	Salbutamol 7
Pirimetamin 1	Salisilamit 1,5,7
Pirvinyum pamoat 10 (gaita : kir- mızı)	Salisilazosülfapiridin 10 (idrar : sarı - turuncu)

Siklandelat 1	Sülfasalazin 4.9.10 (idrar : turuncu - sarı)
Siklizin 1.5,6,7.8	Sülfatiazol 4.9
Siklobenzaprin 5.6	Sülfinpirazon 1.13
Siklofosfamid 2.4	Sülfisoksazol 4.9
Siklopentolat 7,8,17	Sülpirid 5.6
Sikloserin 5.6.7	Teofilin 1
Sikrimin 1.7.8.17	Testosteron 1
Sinameki 10 (idrar : sarı - kahve- rengi veya kırmızı)	Tetrabenazin 5.6
Sinarizin 1.5,6,7.8	Tetrasiklin 2,9,14
Siproheptadin 1.5,6,7.8	Timoksamin 1
Siproteron 1.5,6	Tinidazol 1
Sodyum fusidat 1	Tiyabendazol 1.5,6.7
Sodyum salisilat 1	Tiyetilperazin 5.6,7,8
Spirolakton 1	Tiyopropazat 5.6,7,8,9
Stanozolol 1,18	Tiyoridazin 5.6,7,8,9
Sukralfat 3	Tiyotiksen 5.6,7,8,9
Sulindak 1	Tolazolin 1
Sutoprofen 1	Tolbutamit 6,9,13
Sülfadiazin 4.9	Tranilsipromin 5.6,7,8,12,17
Sülfadimetoksin 4.9	Trazodon 1.5,6
Sülfafurazol 4.9	Triamsinolon 1,18
Sülfameter 4.9	Triamteren 1.10 (idrar : mavi)
Sülfametizol 4.9	Trifluperazin 5,6,7,8,9
Sülfametoksazol 4.9	Trifluperidol 5.6
Sülfametokspiridazin 4.9	Triheksifenidil 5,7,8,17
Sülfapiridin 4.9	Triklfos 5.6

Triklormetiyazid 1.11
Trimeprazin 1.5.6.7.8
Trimetadion 1.5.7.16
Trimetobenzamit 1.5.6.7.8
Trimipramin 5.6
Tripelenamin 1.5.6.7.8
Triprolidin 1.5.6.7.8

Triptofan 5.6
Trokserutin 1
Trolnitrat 2.6.7
Ursodeoksikolik asit 1
Valproik asit 5.6
Varfarin 6.13.16
Viloksazin 1.5.6

14. ve 15. sayfalarda ön ve arka yüzünün

**14. ve 15. Sayfalarda ön ve arka yüzünün
örneğini gördüğünüz hasta eğitim föyü,
Ankara Eczacı Odası'ndan sağlanabilir.**

(100 adedi 50 TL.)

İlaç Kullanım Bilgisi Kılavuzu

Hasta :

İlaç :

- Tok karnına (yemek arasında ya da yemekten sonra) alınız.
- Aç karnına (yemekten 1 saat önce ya da 2 saat sonra) alınız.
- Yemekten yarım saat önce alınız.
- Bol sıvı ile alınız.
- Uykunuzu getirebilir, bu durumda araç ve tehlikeli makine kullanmayınız.
- Alkollü içki içmeyiniz.
- Başdönmesi ve sersemlik yapabilir, bu durumda araç ve tehlikeli makine kullanmayınız, merdiven inip çıkarken dikkatli olunuz ve yataktan aniden kalkmayınız.
- Ağız kuruluğu yapabilir, bu durumda ekşi şekerlemeler ve ciklet çiğnemek yardımcı olabilir.
- Güneşte kalmayınız ve bronzlaşmak amacıyla ultraviyole lamba kullanmayınız.
- İdrarı/gaitayı renge boyayabilir, bu durum ilacı kesmenizi gerektirmez.
- Potasyum bakımından zengin yiyecekler yeyiniz: portakal, greyfurt, domates, karpuz, muz, hurma.
- Eski peynir, bakla, çukolata, salamura balık, tavuk ciğeri, fermente olmuş besinleri yemekten ve şarap, kahve, kafeinli içecekleri içmekten kaçınınız.
- Salisilat içeren ilaçlar (örneğin, aspirin) kullanmayınız.
- Süt ve sütlü yiyecekler yemeyiniz. Demir preparatlarını, demir içeren vitamin preparatlarını ve belirli antasitleri bu ilaçtan ancak 3 saat önce ya da 2 saat sonra kullanınız.
- Demir preparatlarını, demir içeren vitamin preparatlarını ve belirli antasitleri bu ilaçtan ancak 3 saat önce ya da 2 saat sonra kullanınız.
- Bu ilacı kullandığınızı belirten bir kart taşımanız doğru olacaktır.
- Görüş keskinliğinizi azaltarak bulanık görmeye neden olabilir, bu durumda araç ve tehlikeli makine kullanmayınız.
- Şeker hastaları düzenli olarak idrarda şeker kontrolü yapmalı ve herhangi bir anormallik gördüklerinde hekime başvurmalıdır.

Lütfen arkasını da okuyunuz

TEB ANKARA ECZACI ODASI

İlaç Kullanımına İlişkin Genel Uyarılar

- 1) Hekim önerisi ve eczacı uyarısı dışında ilaç kullanmayınız.
- 2) Hekim, diş hekimi ve eczacıya kullandığınız ve yakın geçmişte kullanmış olduğunuz ilaçlar konusunda bilgi veriniz. İlaç alerjiniz varsa, belirtiniz.
- 3) Kullanmakta olduğunuz ilaçları hekimin bilgisi dışında (kendiliğinizden) kesmeyiniz.
- 4) Size iyi gelen bir ilacı, hastalığı benzer görünse dahi başkasına önermeyiniz. Siz de başkasının önerisi ile ilaç kullanmayınız.
- 5) Gebelik sırasında ve emzirirken bilinçsiz ilaç kullanımı bebeğiniz için çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir.
- 6) Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları kullanmayınız. İlaçların etkisini daha önce yitirmemesi için, saklama koşullarına özen gösteriniz.
- 7) İlaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde, kilit altında tutunuz. Boşalan ilaç kutu ve ambalajları ile oynamalarına izin vermeyiniz. Bu konudaki tehlikeleri anlaşılır bir dille çocuklarınıza açıklayınız.

Lütfen arkasını da okuyunuz

TEB ANKARA ECZACI ODASI