



# eczacı

ANKARA ECZACI ODASI  
AĞUSTOS 2003

DÜNYA'DA ve TÜRKİYE'DE

SAYFA

1

İÇİNDEKİLER

2

YENİ İLAÇLAR

3

EDİTÖRDEN

5

BAŞKANDAN MEKTUP

6

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMA VE KANSER RİSKİ

8

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

9

BEBEK HASTALIKLARI VE ECZACI

13

ŞEKER HASTALARINDA OLUŞABİLECEK

YARALAR VE BAKIMI

15

FOLİKÜL İLTİHABI

19

ALOE VERA JEL

22

AKADEMİK YÜKSELMELER

23

SINAMEKİ

25

BİLGİSAYAR ERGONOMİSİ

27

ECZ. ORHAN ÖZKIN

31

SORUNLAR ÇÖZÜMLER

37

FİTOTERAPİ

39

HABERLER

45

KISA TEMEL BİLGİLER

47

MUTLULUKLARI PAYLAŞALIM

48

YENİ AÇILAN ECZANELER





**Kızıl çam!**

Artık **orman ağacı** değilsin!

Seni **kanunla**

**orman ağacı** olmaktan  
çıkarıyorlar!



# yeni ilâçlar

## **P** EGASYS (Roche)

### **Etken Madde :**

- Peginterferon alfa-2a 135 mikrogram/0.5 ml

### **Kullanımı :**

- Erişkin hastalarda kronik Hepatit C tedavisinde kullanılır.

### **Uyarılar :**

- Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda, kalp hastalarında, karaciğer hastalarında, pulmoner hastalığı olanlarda, ketoasidoza eğilimli şeker hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

### **Yan Etkiler :**

- Asteni, letarji, göğüs ağrısı, gribe benzer belirtiler, kırıklık, bulantı ve kusma, sıcak basması, üşüme titreme, bellek bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, güçsüzlük, tremor ve kas spazmları, boyun ve sırt ağrısı, dermatit, terleme, döküntü, ışığa duyarlılık, ağız kuruluğu, diş eti kanaması, ağızda ülserasyon, anksiyete, libido azalması, kilo azalması, öksürük, bulanık görme, çarpıntı ve yüz ve boyunda sıcaklık hissi.

### **Ticari Şekli :**

- 135 mikrogram/0.5 ml 1 adet kullanıma hazır şırınga
- 135 mikrogram/0.5 ml 4 adet kullanıma hazır şırınga



## **V** İOREF 25 MG. TABLET (Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.)

### **Etken Madde :**

- Rofekoksib 25 mg

### **Kullanımı :**

- Yetişkinlerde akut ağrı tedavisi osteoartritte semptom ve bulguların akut ve kronik tedavisi, primer dismenore tedavisi için kullanılır.

### **Uyarılar :**

- İlerlemiş böbrek hastalığı olan kimselerde, önceden peptik ülser veya gastrointestinal kanama geçirmiş hastalarda, orta derecede ve ilerlemiş karaciğer hastalığı olanlarda, gebeliğin son alarında kullanılmamalıdır. Vioref astımlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle aspirine hassas olan astımlı hastalarda dikkatli olmalıdır.

### **Yan Etkiler :**

- Karın ağrısı, ishal, dispepsi, bulantı, ödem, hipertansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi.

### **Ticari Şekli :**

- 14 ve 28 tabletlik blister ambalajlarda



## **A** ZELTİN 500 mg Film Tablet İlaç San. Ve Tic. A.Ş.)

### **Etken Madde :**

- Azitromisin dihidrat 500 mg

### **Kullanımı :**

- Alt solunum yolları enfeksiyonları, üst solunum yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, genital enfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlarda kullanılır.

### **Uyarılar :**

- Nadir olarak ciddi allerjik reaksiyonlar, anjiyoödem ve anafilaksi bildirilmiştir? Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda azitromisin kullanımı ile ilgili yeterli deneyim yoktur. Azitromisin bu hastalarda dikkatle kullanılmıdır.

### **Yan Etkiler :**

- Klinik araştırmalarda bildirilen yan etkilerin çoğu hafif ve orta derecede olup ilâcın kesilmesiyle kaybolmuştur. *Kardiyovasküler:* Çarpıntı, göğüs ağrısı *Gastrointestinal:* Dispepsi, flatulans, kusma, melena ve kolestatik sarılık. *Genitoüriner:* Monilia, vajinit ve nefrit. *Sinir sistemi:* Baş dönmesi, baş ağrısı, vertigo ve somnolans. *Genel:* Yorgunluk. *Allerjik:* Deri döküntüsü, fotosensitivite ve anjiyoödem.

### **İlaç Etkileşmeleri :**

- Magnezyum ve alüminyum içeren antasidler azitromisinin doruk düzeylerini azaltır.

### **Ticari Şekli :**

- 3 Film tabletlik bilister ambalajda

### **Ecz. Murat ŞÜKÜROĞLU**

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi