

Troleandomisin

Pozoloji : Günde 1-2 g (3-4 defada)

TROLEANDOMİSİN İÇEREN İLAÇLAR

İLACIN ADI	FARMASÖTİK ŞEKLİ	FİRMA	MİKTARI	FİYATI	TARİHİ
TAO	16 KAP.	57	250 MG	14850	15/02/9
TAO	16 TAB.	57	500 MG	40000	15/02/9
TAO	60 CC ŞURUP	57	250MG/5ML	6600	06/11/9
TEKMİSİN	16 KAP.	69	250 MG	14500	25/03/9
TEKMİSİN	16 FİLM TAB.	68	500 MG	32500	25/03/9

ADENDA : Pristinamisin

Pristinamisin'in antibakteriyel spektrumu makrolitlerinkine benzer. Bununla beraber absorpsiyonu yeterli olmadığından pek ilginç değildir. Pristinamisin müstahzarları, günümüzde Türkiye'de bulunmamaktadır.

VIII. LINKOMİSİN VE KLİNDAMİSİN


Linkomisin ve bunun yarı sentetik türevi olan klindamisin Gram (+) coccuslara karşı makrolitlerle aynı etki spektrumunu gösterir Anaeroblara ve bakterioitlere karşı çok etkilidirler. Neisseria'lara Haemophilus influenzae ve mycoplasma'ya Chlamydia'lara bir etkisi yoktur. Klindamisin, linkomisinden çok daha fazla etkilidir ve bu nedenle tercih edilir. Bu bileşikler anaerobların enfeksiyonlarına karşı kullanılır. Fakat bu endikasyonda metronidazol bu antibiyotiklerin yerini almaktadır.

Linkomisin ve klindamisin, penisilinaz salgılayan ve salgılamayan stafilokoklara karşı, penisiline allerji söz konusu ise veya penisilin etkisizse, penisilin yerine kullanılır.

Ağızdan, klindamisin, çok bariz olarak linkomisinden daha iyi rezorbe edilir. Her ikisi de karaciğerde biyotransformasyona uğrar.


Bellibaşlı istenmeyen etkileri: mide-barsak bozuklukları, bulantı kusma ve bilhassa diyaredir. Clostridium'ların çoğalmasına bağlı olarak, psödomembranoz kolit görülebilir. Bu istenmeyen etki bir çok antibiyotikle görülürse de daha çok linkomisin ve klindamisin ile ortaya çıkar. Paranteral kullanılsa dahi bu istenmeyen etkiye rastlanmaktadır.

CH₃CH₂CH₂



Clindamycin

CH₃CH₂CH₂



Lincomycin

Linkomisin

Pozoloji :

- Erişkin : Günde 1.5-2 g (3-4 defada)
- Çocuk : Günde 30-60 mg/kg (3-4 defada)

Linkomisin, siklatat, kaolin-pektin ile etkileşir : Linkomisin serum düzeyleri önemli ölçüde azalır. İlaçlar 2 saat ara ile alınmalıdır.

LINKOMİSİN İÇEREN İLAÇLAR

İLACIN ADI	FARMASÖTİK ŞEKLİ	FİRMA	MİKTARI	FİYATI	TARİHİ
LINCOCIN	1 FLK.	28	300 MG	6050	07/03/91
LINOCIN	1 FLK.	28	600 MG	1450	19/04/88
LINCOCIN	1 AMP.	28	600 MG	3950	07/03/91
LINCOCIN	50 AMP.	28	600 MG	184800	07/03/91
LINKOMİSİN	1 AMP.	41	600 MG	4500	12/03/91
LINKOMİSİN	50 AMP.	41	600 MG	148000	12/03/91
LINKOMİSİN	12 KAP.	41	500 MG	36000	12/03/91
LINCONOBEL	1 AMP.	52	600 MG	4000	11/03/91
LINCONOBEL	50 AMP.	52	600 MG	117900	11/03/91
LINCONOBEL	100 AMP.	52	600 MG	51277	11/01/88
LINKAMİN	1 AMP.	14	600 MG	1872	03/02/89
LINKOLE	1 AMP.	107	600 MG	3950	13/03/91
LINSİF	1 AMP.	65	600 MG	3000	12/03/91

Klindamisin

Pozoloji :

- Erişkin : Günde 600-1200 mg (3-4 defada)
- Çocuk : Günde 8-20 mg/kg (3-4 defada)

KLİNDAMİSİN KLORHİDRAT İÇEREN İLAÇLAR

İLACIN ADI	FARMASÖTİK ŞEKLİ	FİRMA	MİKTARI	FİYATI	TARİHİ
CLEOCIN	16 KAP.	28	150 MG	14300	01/12/90
KLİNDAN	16 KAP.	82	150 MG	22500	13/03/91
KLİNOKSİN	16 KAP.	21	150 MG	18000	19/02/91

KLİNDAMİSİN PALMİTAT İÇEREN İLAÇLAR

İLACIN ADI	FARMASÖTİK ŞEKLİ	FİRMA	MİKTARI	FİYATI	TARİHİ
CLEOCIN	100 CC İÇİN GRAN	28	75MG/5ML	18550	07/03/91


KLİNDAMİSİN FOSFAT İÇEREN İLAÇLAR

İLACIN ADI	FARMASÖTİK ŞEKLİ	FİRMA	MİKTARI	FİYATI	TARİHİ
CLEOCIN	1 AMP.	28	150 MG	11200	01/12/90
CLEOCIN-T	30 CC SOLUS.	28	10MG/5ML	18500	01/12/90
KLİNDAN	1 AMP.	82	300 MG	14300	13/03/91
KİLİNDAN	1 AMP.	82	600 MG	21500	13/03/91
KLİNOKSİN	1 AMP.	21	300 MG	9000	19/02/91

IX. RİFAMİSİN'LER

Rifamisinler (rifamisin SV ve rifampisin) Enterococcus'lar hariç Gram (+) coccus'lara Neisseria'lara ve Mycobacterium tuberculosis'e etkilidirler. Gram (-) bakteriler üzerine orta derecede aktiftirler.

Rifamisinler bilhassa safra yoluyla atılan antibiyotiklerdir. Rifamisin SV, sıklıkla safra yolları enfeksiyonlarında kullanılır.



Rifampin