

## KADINLARDA AKCİĞER KANSERİNDEN ÖLÜM İKİ KATINA ÇIKTI

1960-1980 yılları arasında (\*) 28 endüstrileşmiş ülkede kanserden ölüm de artışlar oldu. Hem kadınlarda hem de erkeklerde ölüm nedeni olarak Akciğer Kanseri birinci sırayı almakla birlikte, kadınlarda da bu nedenle ölüm de son yirmi yılda iki katı artış gözlenmiştir.

WHO Weekly Epidemiological Record mortalitedeki artışları gösteren bir rapor yayınlanmıştır. Buna göre,

— Bu artış erkeklerde %55 olmuş bu nedenle ölüm sayısı ise 320.000 den 898.000'e yükselmiştir.

— Kadınlarda ise bu sayı 206.000 den 720.000 çıkararak %40 lık bir artış göstermiştir.

Yaşa bağlı olarak kanser olma olasılığı arttığından yaş ve nüfus artışı gözönüne alınarak yeni bir düzenleme yapıldığında ortaya değişik bir tablo çıkmaktadır, erkeklerin mortalitelerindeki artış %18.6 iken kadınlarda bu oran serviks kanserinden olan ölümlerin azalması nedeni ile %2'lik bir düşüş göstermiştir.

Sayılar 16 tür kanserin neden olduğu ölümleri vermektedir. Analizi yapılan dört ana grup ise akciğer, meme, serviks ve mide kanserleridir.

Akciğer ve meme kanserlerinden ölümler artarken, serviks ve mide kanserlerinin neden olduğu ölümlerde azalma görülmüştür.



- Akciğer kanserinden erkeklerdeki ölüm sayısı % 76'lık bir artış göstererek 137.000'den 255.000'e fırlamıştır. Kadınlarda aynı nedenle olan ölümlerde ise % 135 artış görülmüş, sayı 44.000'den 66.000'e yükselmiştir. Bu da sigaranın körüklediği kanserlerde yeterince etkili önlem alınmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır.
- Meme kanserinde ölümler 44.000'den 118.000'e yükselmiş, bu da % 22'lik bir artış demektir. Bu artışın % 30'unu 45-64 yaş gurubundaki kadınlar oluşturmaktadır.
- Servis kanserinde 23.000'den 22.000'e bir düşüş olmuştur. Erken tanı metodlarının geliştirilmesi ile bu tür kanserden ölümler azalmıştır.
- Mide kanserlerinin dünyada en yaygın görülen tipinin neden olduğu ölümlerde de bir azalma gözlenmiştir. Erkeklerde bu sayı 14.000 ile 105.000 arasında düşmüştür.

Kadınlarda ise 12.000 ile 72.000 arasında bir azalma olmuş, yüzde olarak bu azalmayı erkeklerde % 45, kadınlarda ise % 58 olarak ifade edebiliriz. Mide kanserinin en sık görüldüğü Japonya'yı bile içine alan bu azalma Dünya'nın tüm ülkelerinde de gözlenmiştir.

*Çeviren: Ecz. Leyla ÜSTEL*

*Kaynak: World Health,*

*January-February 1986*

(\*) Bilgi sağlıyan 28 endüstrileşmiş ülke: Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, Danimarka, Federal Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç, İspanya, İrlanda, İzlanda, İtalya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Japonya, Kanada, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya, Yeni Zelanda.

## DUYURU

15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmî Gazete'de Farmasötik ve Tıbbî Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipler ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.