



## İŞTAHI VE TAD DUYUSUNU ETKİLEYEN İLAÇLAR

### İştahi Artıran İlaçlar:

Antihistaminikler, Benzodiazepinler, Fenotiyazinerler, Hipoglisemik İlaçlar, Kortikosteroidler, Trisiklik Antidepresanlar.

### İştahi Azaltan İlaçlar:

Antikonvülsanlar, Antineoplastik İlaçlar, Digital Glikozidleri, Estrojenler, Flurazepam, Indometasin, Karbonik Anhidraz İnhibitörleri, Levodopa, Lityum Tuzları, Metronidazol, Monoamin Oksidaz İnhibitörleri, Prokainamid, Semipatominetikler, Tetrasiklinler, Tiyazidler, Tolazamid.

### Tad Duyusunun Keskinliğini Azaltan İlaçlar

Azatiyoprin, Baklofen, Fenilbutazon, Karbamazepin, Klofibrat, Levodopa, Linkomisin, Metimazol, Penisilamin, Sulfasalin.

### Algılanan Tadı Değiştiren İlaçlar

Albuterol, Benoksaprofen, Griseofulvin, Histidin, Kaptopril, Lityum Karbonat, Mezlosilin

### Metalik Tadı Olan İlaçlar

Allopurinol, Altın Bileşikleri, Etambutol, Metokarbamol, Metronidazol.

### Tadı Açı Olan İlaçlar

Fenilbutazon, Flurazepam, Karbamazepin.

### Tadı Kötü Olan İlaçlar

Bromokriptin, Dipiridamol, Kinidin, Kloralhidrat, Klorpromazin, Metaproterenol, Metronidazol, Penisilin, Propranolol, Tiyordazin, Trazodon, Vitaminler.

Çeviren: Ecz. Ayşe ÇELİKER

Kaynak: The Ohio State University Hospitals - Pharmacy Bulletin, Vol. 12, No. 1, Jan. 1984

