

Vildan ÖZCAN

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ TEHDİDİ BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, özellikle ilkbahar-yaz aylarında ortaya çıkan ve keneler yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin (KKKA) görüldüğü yerlerde halkı bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. Çorum, Tokat, Amasya, Sivas, Çankırı ve Yozgat gibi illerde hastalıktan korunma yolları konusunda halkı bilgilendirici broşür dağıtılırken uyarıcı afişler asılıyor.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi Prof.

Dr. Mehmet Taşyaran, daha çok kuzey ve orta bölgelerde rastlanmakla birlikte git gide güney bölgelerde de vakalar görüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız tüm ülke genelinde dikkatli olmalı" dedi..Tedavide ağızdan alınan "ribavirin" etken

maddeli ilacın ölüm oranı üzerinde bir etkisinin olmadığını kaydeden Taşyaran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedavinin özünü destek tedavisi oluşturuyor. Ölümü azaltan zamanında yapılan destek tedavisidir. Bu tedavi sırasında gerekirse kan veriliyor, böbrek yetmezliği gelişirse hemodiyaliz uygulanıyor yada hasta solunum cihazına bağlanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlık kuruluşuna zamanında başvurmasının önemi büyük." Risk altındaki kişilerin vücutlarını sık aralıklarla kontrol etmelerinin önemine işaret eden Taşyaran, "Kene bir cımbızla deriye yapıştığı yerden tutulup, sağa sola oynatılarak çivi söker gibi çıkarılmalıdır" dedi.

BEBEĞİN CİNSİYETİ 6. HAFTADA ÖĞRENİLEBİLECEK

Anne karnındaki bebeğin cinsiyetini 6. haftada belirleyen basit bir yöntem geliştirildi. Bu yöntemde, parmaktan alınan bir damla kanla bebeğin cinsiyeti tespit ediliyor. Özel filtreli bir kağıda damlatılan kan ilgili laboratuara gönderiliyor ve buradaki uzmanlar, erkeklerdeki Y kromozomunun bulunup bulunmadığını belirlemek için testler yapıyorlar. Ancak bu

yöntemin, kürtaj sayısında büyük artışa yol açabileceğinden endişe ediliyor. Bu tür yöntemlerin, dünyadaki kadın-erkek sayısı arasındaki dengeyi bozmasından korkuluyor. LIFE adlı kuruluştan Michaela



Aston, "Bu test çok tehlikeli. Bebeklerin sadece istenmeyen cinsiyetten oldukları için aldrılmasına yol açabilir" dedi. İngiltere'de, erken cinsiyet testleri, Sağlık Hizmetleri tarafından, sadece cinsiyet kaynaklı genetik hastalık riski bulunması durumunda yapılıyor.

İKİNCİ KUŞAK HIV/AIDS İLAÇLARI UCUZLUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Abbott Laboratuvarları'nın HIV + yada AIDS hastası kişilerin, "ikinci kuşak" denilen virüsü geriletilici (antiretroviral) terapiler için özel olarak geliştirilmiş ilaçların fiyatını indirme kararını onayladı.

Kaletra/Aluvia olarak pazarlanan LPV/r nin fiyatı Abbott tarafından, pek çok HIV/AIDS ilacının çok pahalı olduğu ve bu ilaçlara talebin arttığı az gelirli ülkelerde indirildi. Dünya çapında, özellikle az gelirli ülkelerde bu ilaçlarla tedavi gören insan sayısı giderek yükseliyor. Bu durum da pek çok ülkede ilk kuşak diye anılan tedavilere karşı direncin arttığını gösteriyor. WHO, Abbott'ın aldığı kararı çok olumlu karşıladı ve diğer ülkelerde de böyle bir adım atılması gerektiğini belirtti.

RAHİM AĞZI KANSERİ 2 DAKİKADA 1 CAN ALIYOR

Kadınlar arasında meme kanserinden sonra en sık görülen 2. kanser türü olan rahim ağzı kanseri yüzünden, dünyada her 2 dakikada 1 kadın hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tümü Human Papillomavirüs'ün (HPV) belirli tiplerinden kaynaklanıyor. Milyonlarca insan, belirti göstermeyen bu virüsü taşıyor.

HPV'nin yaklaşık 30 tipinin genital HPV olarak bildirildiğinin anlatıldığı www.rahimagzikanseri.org adlı internet sitesinde şu bilgilere yer veriliyor; "Rahim ağzı kanseri bir kadının yaşamı boyunca gençlik döneminden itibaren çok nadir olmakla beraber herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Rahim ağzı kanseri tanısı koyulan tüm kadınların yaklaşık yüzde 50'si 35-55 yaşları arasındadır.


Bu kadınların pek çoğu onlu ve yirmili yaşlarında HPV ile karşılaşır. Rahim ağzı kanserini saptamanın birincil yolu Pap testidir.

Jinekolojik muayenenin bir parçası olan Pap testi (Papanicolaou smear) rahim ağzı (serviks) duvarındaki anormal hücrelerin servikal kanser öncülleri veya rahim ağzı kanserine dönüşmeden önce saptanmasına yardımcı olur Böylece anormal hücrelerin saptanıp tedavi edilmesi, rahim ağzı kanseri gelişimini önler."

Rahim ağzı kanserinin ileri evreye ulaşınca kadar herhangi bir belirti göstermeyebileceğinin belirtildiği sitede, hastalığın, anormal kanama, cinsel ilişki sonrası kanama, anormal akıntı ve kasık ağrısı şeklinde kendini gösterebileceği kaydediliyor.

ULUSAL BÖBREK NAKLİ BEKLEME LİSTESİ GELİYOR

Sağlık Bakanlığının, organ bağışıyla bulunan böbreğin takılacağı hastanın kısa sürede belirlenmesi ve adaletli dağıtımını sağlamak için "Ulusal Böbrek Nakli Bekleme Listesi" hazırlayacağı bildirildi. Hazırlıklar çerçevesinde organ ve doku nakil merkezlerindeki eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Odabaş, "Bu eğitim, organ ve doku nakil merkezlerinin bilgisayar



kayıtlarının düzenlenmesini içeriyor. Her organ ve doku nakil merkezinin verilerini bu programa aktararak devreye sokacağız" dedi. Alıcıların doku kayıtlarının bulunacağı Ulusal Böbrek Nakli Bekleme Listesiyle doku uyumu, yaş, diyalize girme süresi

gibi kriterler belirlendiğini ifade eden Odabaş, donör çıktığında bulunan böbreğin bu kriterler çerçevesinde, süratli bir şekilde en uyumlu 3 alıcının bulunduğu bölgeye gönderileceğini bildirdi.

İNGİLİZLER ANTİDEPRESANA SİĞİNİYOR

İngiltere'de aile hekimlerinin rekor seviyede kişiye antidepresan verdiği, sadece geçen bir yıl içinde 31 milyon müsekkim ilaç reçetesi yazıldığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı ve uzmanların uyarılarına rağmen, antidepresan kullanımının artmasını eleştiren The Times gazetesi, "Antidepresan Milleti Olduk" diye manşet attı. İngiltere'de aile hekimlerinin büyük bölümünün de bu tür ilaçların çok fazla verilmesinden şikayetçi olduğu, ancak hastalarının ısrarlarına dayanamadıkları, kaynak ve eleman yokluğundan dolayı hastaya davranış tedavisi öneremedikleri için ilaç yazmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

İngiltere'de yapılan araştırmalar, depresyonun her beş kişiden birini hayatının en az bir döneminde etkisi altına aldığını gösteriyor. Bu da 16-75 yaş arasındaki nüfusun içinde en az 1,5 milyon kişinin depresyon etkisi altında olduğu anlamına geliyor. Depresyon ayrıca, İngiltere'deki intiharların yüzde 70'inde temel etkenlerden biri kabul ediliyor.