

yeni
ilâçlar



TRIFLUPROMAZİN HİDROKLORÜR: Bu ilaç 10 - (3-dimevilami-nopropil) 2 - (trifluorometil) - fenotiyazinin hidroklorürü = (2-trifluoro-metil promethazin hidroklorür) dür.

Triklorpromazin hidroklorür'e benzer ve klor yerine flour ihtiva eder. Bu ilaç had ve müzmin psikozlarda, bilhassa şizofreni, mani, toksik psi-kozlar, alkolizm ve bunama gibi hallerde psişik semptomları düzeltici bir tesir göstermektedir. Bununla beraber her türlü psikozlarda ve bilhassa depresyon halinde olanlarda kullanılmamalıdır. Yan tesirlerinin diğer fenotiyazin türevlerinden daha az olduğu söylenmektedir. Triflupromazin hidroklorür ağızdan verilir; nadir hallerde intramuskular veya intravenöz injeksiyonu yapılır. Umumiyetle yetişkinlerde, ağızdan günde üç defa 25 mg. verilebilir.

PROPARAKAİN HİDROKLORÜR Benzoik asidin 2 - Dietilaminoetil 3 - Amino 4 - oksi propil türevinin hidroklorürüdür. Oftalmolojide kul-lanılan bir lokal anestetik olup prokain, tetrakain v.s. gibi anestetikler-den farklı olarak m - aminobenzoik asid bileşigidir (diğer anestetikler p - aminobenzoik asid türevleridir). Tesiri sür'atlı ve tetrakain'den daha kuvvetlidir; 0.5 % lik solüsyondan 1-2 damla damlatıldıktan 20 saniye sonra anestezi başlar ve bu tesir 15 dakika kadar devam eder.

LANİBROMİN 5 - etil - 5 - krotilmalonil üre, digoksin, teofillin, teobromin ihtiva eden drajeler veya Digoksin, 5- etil -5- krotilmalonil üre, Dioksipropilteofillin, dioksipropilteobromin ihtiva eden suppositvarları halinde kalp kuvvetlendirici (Cardiotonique) olarak bilhassa ihtiyarlarda kullanılmaktadır. İlaçta teobromin ve teofillin'in bulunması digoksinin birikmesini önler.