

Öksürük İlâçları

Eczacı Hamdi Dürüst

Yukarı teneffüs sistemini tahrış eden yabancı maddeleri veya ifrazatı dışarı atmak için göğüs adalelerinin diafram ile birlikte takallusuna öksürük diyoruz. Şiddetli fakat kesik olarak tezahür eden bu takallus, refleks veya volunteer olabilir.

Yukarıda umumi tarifini yaptığımız öksürüğün klinikte üç şekline tesadüf edilir, ve tedavisi de bu klinik şekillere göre tayin edilebilir:

1. Kuru öksürük
2. Balgamlı öksürük
3. "Dolu" öksürük.

Şimdi, öksürüğün bu üç klinik şecline göre, tedavide kullanılan ilaçları gözden geçirebiliriz.

1. "Dolu" Öksürük, ekseriya göğsin dolu fakat ifrazatin hemen yok derecede az olduğu ve hastaya çok sıkıntı veren klinik şeklidir. Bu tip öksürüklerin tedavisinin esasını "expectorant" ilaçlar teşkil ederler ki bu ilaçları da söylece hulâsa edebiliriz:

A. **Kusturucu Expectorant'ları.** Bu sınıfa girecek ilaçların kullanılış yerlerine göre iki dozu vardır. Derecettigimiz vasatı dozlar balgam söktürmek içindir; bunların üzerinde verilecek miktarlar ise "emetic" = kusturucu tesir yaparlar.

Apomorphine HCl (1 - 2 mgm);

Tartar Emetic (1 - 3 mgm),

Ipecac preparatları: (Ipeca tozu 0.06 Gm), (Dover tozu şeklinde 0.3 Gm), ve (Ipeca şurubu olarak 0.75 Gm)

B. **Tuzlu Expectoranları,** meyanında bir çok klâsik öksürük ilâcını zikredebiliriz: Ammonium Chlorure (0.3 Gm), Ammonium Carbonate (mideyi tahrış edebilir), Potassium İodure (0.3 Gm) ve bilhassa ateşli hastaların öksürüklerinde kullanılan Sodium Citrate ve Sodium Acetate.

C. **Göğüs Yumuşatan ekspektoranlar** (demulcents); isminden de anlaşılabileceği şekilde müsilaj ihtiva eden reglisse, guimauve (hatmi), gomme arabique, gibi nebatî menşeli drokların infusion, şurup

vs. şeklindeki muhtelif ispençiyari preparatlarından ibarettir, ve ötedenberi halk arasında öksürük ilâci olarak tanınmışlardır.

2. Balgamlı Öksürük, yukarıdaki tipin tam aksine, mukozaları (muhati gışaları) gevşemiş ve tonozitesini kaybetmiş akciğerlerin tezahürüdür. Kronik bronşit vakalarında çok rastlanır. Bu vakalarda tonikler ve teneffüs cihazındaki kan deveranını artıracak maddeler verilerek zayıflayan mukoza tenbih ettirilir, adeta bir anemi (kansızlık) geçirmekte olan muhati gışa kan deveranının düzeltilmesi neticesi beslenip takviye edilmiş olur. Diğer sınıf öksürük ilaçlarının hiç birinin tesir edemediği bu tip öksürüklerde "tahriş edici ekspectoranlar" kullanılır. Bu maddeler akciğer yolu ile itrah edildiklerinden, beklenen terapötik tesirlerini icra ederler:

Creosote (0.5 cc.)

Guaiacol (0.5 cc.).

Guaiacol Carbonate (1 Gm),

Terpine Hydrate (0.3 Gm)

Potassium guaiacol sulfonate ("Thiocol" Roche) 0.3 Gm.

Yalnız tahriş edici ekspectoranların kullanılmasında dikkat edilecek en mühim husus kan kusan (hemoptizik) hastalara verilmemesidir.

3. Kuru Öksürük, medulladaki öksürük merkezlerinin türlü sebeplerle tenbihi neticesi tezahür eder. Bronşitlerde, soğuk algınlığının başlangıcında öksürüğün bu şecline çok rastlanır. Tedavisinin esasını da, binaenaleyh, medulladaki öksürük merkezlerinin teskinini teskil eder. Buna ilâveten, boğazdaki gıcıçı mahalli olarak giderecek lozanj ve pastillerle tântür benzoinli büğular, ve göğüse sürülecek iod ve camphre'li liniment ve yakılar da kullanılır.

Öksürüğün en sık rastlanan bu şecli igin klâsik ve yeni olmak üzere bir hayli ilaç bu gün tababette kullanılmaktadır. Bunları, menşeleri ve kimyevi strüktürlerine göre 6 sınıfı etüd edebiliriz:

1. **Phenanthrene** türleri (klâsik ve yeni olmak üzere ayrıca ikiye ayrılabılırler)

2. **Isoquinoline** türleri

3. **Phenyl Acetic Acid** türleri

4. **Hexanone** türleri

5. **Naphthalene** türleri

6. **Piperidinedione** türleri

Simdi günün en yeni ve bir kısmı henüz tecrübe safhasında olan öksürük ilaçlarını ihtiva eden yukarıdaki altı sınıfı tetkik edebiliriz:

1 — A: Klâsik Phenanthrene türleri, ekserisi opium preparatları veya opium alkaloidleri olan bu sınıf ilaçlar, bütün mahzurlarına

rağmen ilk hatira gelen öksürük sedatifleri arasındadırlar. Codeine, Codeine Phosphate, Dionine (Diethylmorphine), Morphine (bilhassa şurup şekli), Heroine, Dihydrocode none (Dicodide)'i bu meyanda sıralayabiliriz. Bu ilaçların bariz mahzurları, devamlı kullanma neticesi habituation tabir ettiğimiz alışkanlık tevlit etmeleri ve teneffüs sisteminde depresyon, dalgınlık ve uyku, ve bağırsak peristalsisinin teskinini neticesi kabızlık da husule getirmeleridir.

1 — B: Yeni Phenanthrene'ler: Dextromorphan HBr, N. N. D., halen Romilar ismi altında Roche firması tarafından şurup ve tablet olarak piyasaya çıkarılmıştır. Upjohn firması aynı müstahzarı Metheerate ve Terpine Hydrate'li Methorate isimlerile (T. H. + M.) rumuzu ile imal etmektedir.

Nalorphine HCl (USP)) ve **HBr (BP)**: injektion olarak Merck firması tarafından Nalline ve Burroughs Wellcome tarafından da **Lethridone** isimlerile piyasaya çıkarılmıştır. Teneffüs sisteminin kuvvetli bir münebbihidir.

Pholcodine BPC, şurup şeklinde verilmektedir.

2. Isoquinoline türleri

Moscapine (Narcotine) Pastil ve solusyon halinde kullanılmaktadır. Bu madde aslında papaverine gurubundan bir afyon alkaloididir.

3. Phenyl Acetic Acid türleri

Carbetapentane Citrate (NND) U. C. B. ve Squibb firmaları tarafından şurup ve tablet şeklinde ve "Toclase" veya "Tos-sedrin" isimlerile imal edilmektedir. Uyuyucu hassaları yoktur, buna mukabil beyindeki öksürük merkezlerini teskin eder. Kullanıldığı vakaların % 91 inde salâh temin edildiği klinik müşahedelerle tesbit edilmiştir.

4. Hexanone türleri:

Methadone HCl (USP, BP) ağızdan 1,5 - 2 mgm lik dozlarla alındığında bu miktarın 10 misli kodein'in antitusiv tesirini içera eder.

Normethadone Hoechst firması tarafından "Ticarda" ismi altında tababete arzedilmiş bulunmaktadır. Kimyevi strüktürü 6-dime tyhlamino - 4: 4 - diphenylhexan - 3 - one'dur. Tesir bakımından methadone'a çok benzer. Antitussiv hassalarile birlikte analjezik özellikleri de mevcuttur. Tablet ve damla şeklinde günde 7,5 ilâ 10 mgmlık kâhil dozu olarak verilebilir. Teneffüs merkezinin deprese ettiği gibi; bronşit, farinjit, boğmaca hastalıklarının müz'ic ve spazmodik öksürükleri ile verem ve kuru zatürleçen öksürüklerinin tedavisinde, ayrıca ameliyat esnası veya ameliyat sonrası öksürüklerinin izalesinde de muvaffakiyetle kullanılmaktadır.

5. Naphthalene türleri, arasında "Becantex" ve "Becantyl" isimli ilaçlar tablet ve şurup şekillerinde imal edilmektedirler. 30 miligramlık dozlarda verilmektedir.

6. Piperidinedione türleri Roche firmasının "Sedulon" isimli ilaç listemizin son kalemini teşkil etmektedir. Öksürük merkezlerinin depresanı ve hafif bir sedatif tesir icra etmektedir. Bilhassa asabi menşeli öksürüklerde muvaffakiyetle kullanılmaktadır. Roche firmasının, benzer diğer bir müstahzarı olan "Persedon" tabletleri hipnotik olarak kullanılmaktadır. "Sedulon" şurup olarak verilmektedir.

Öksürük ilaçları sahasında araştırmalar devam etmekte ve muhtelif firmaların bu sahada kaydettiği terakkilerle hemen her gün yeni müstahzarlar tababete arzedilmektedir. Bununla beraber, klâsik öksürük ilaçları ile halkın ilaçlarının da kullanılmasına devam edilmektedir.

B i b l i y o g r a f y a

1. Kanaan, M. **Pharmacology Notes**, 1951.
2. Osol - Farar, **United States Dispensatory**. 25th ed., Lippincott, 1955.
3. Karamanukian, L. **Cough and the Newer Antitussives**, "The Apothecary", 13, 32-35, Amer. Univ. Beirut, 1958.